א. $n=1$ $\quad \frac{3}{1\cdot 2\cdot 2^1} = \frac{1}{2\cdot 2} = 1$ ✓

$n=k+1$ $\quad \frac{3}{1\cdot 2\cdot 2^1} + \ldots + \frac{k+2}{k(k+1)2^k} + \frac{k+3}{(k+1)(k+2)2^{k+1}} + \frac{1}{2^{k+1}(k+2)} \stackrel{?}{=} 1$

$$1 \stackrel{?}{=} \frac{1}{(k+1)2^k} + \frac{k+3}{(k+1)(k+2)2^{k+1}} + \frac{1}{2^{k+1}(k+2)} - 1$$

$$1 = \frac{(k+1)+(k+3)+(k-2)}{(k+1)(k+2)2^{k+1}} + 1$$

ב.

$$1 = \frac{1}{2^n(n+1)} + \frac{n+2}{2^n(n-1)n} + \frac{k+2}{k2^k(k-1)k} + \frac{k+1}{k-1^k(1-k)k} + \ldots + \frac{4}{2\cdot 3\cdot 2^2} + \frac{3}{1\cdot 2\cdot 2^1}$$

לפי הטענה הקודמת

אם נחסיר את
נקבל

אחרון שהחסרנו שלו כבר הופיע
אז נשאר לנו רק את שנשאר
ולכן אחרי שנשאר החצי יהיה 1.

$$\frac{3}{1\cdot 2\cdot 2^1} + \ldots + \frac{k+1}{k-1^k(1-k)k}$$