2.76
ב5

$$12\cdot 2^{\sin\left(\frac{\pi}{4}+\frac{x}{2}\right)} - 5\cdot 2^{\cos\left(\frac{\pi}{4}-\frac{x}{2}\right)} = 4$$

$$12\cdot 2^{\sin\left(\frac{\pi}{4}+\frac{x}{2}\right)} - 5\cdot 2^{\cos\left(\frac{\pi}{4}+\frac{x}{2}\right)} = 4$$

$$A = 2^{\sin\left(\frac{\pi}{4}+\frac{x}{2}\right)} \qquad (A>0)$$

$$12A - 5A^2 = 4$$

$$5A^2 - 12A + 4 = 0$$

$A=2 \rightarrow \quad 2^{\sin\left(\frac{\pi}{4}+\frac{x}{2}\right)} = 2 \rightarrow \quad \sin\left(\frac{\pi}{4}+\frac{x}{2}\right) = 1 \rightarrow \quad \frac{\pi}{4}+\frac{x}{2} = \frac{\pi}{2} + 2\pi k$

$$\boxed{x = \frac{\pi}{2} + 4\pi k}$$

$A = \frac{2}{5} \rightarrow \quad 2^{\sin\left(\frac{\pi}{4}+\frac{x}{2}\right)} = \frac{2}{5}$

בודאי שאין פתרון כזה כי $2^x$ תמיד גדולה מ-0 ולכן אין פתרון במקרה זה.