54.

$$\begin{cases} a_m = n^2 = a_1 + d(m-1) \\ a_n = m^2 = a_1 + d(n-1) \end{cases}$$

$$n^2 - m^2 = d(m-1-n+1)$$

$$n^2 - m^2 = d(m-n)$$

$$(n-m)(n+m) = -d(n-m) \quad / : (n-m)$$

$$\boxed{d = -m-n}$$

נציב למשל את הראשונה

$$n^2 = a_1 + d(m-1)$$

$$n^2 = a_1 - (m+n)(m-1)$$

$$n^2 = a_1 - m^2 - nm + m + n$$

$$\boxed{a_1 = n^2 + m^2 + nm - m - n}$$

נראה כעת שמתקיים $a_n + 2a_{n+m} + a_m$

$$a_n + 2a_{n+m} + a_m = n^2 + 2\left(a_1 + d(n+m-1)\right) + m^2 =$$

$$= n^2 + 2\left(n^2 + m^2 + nm - n - m - (n+m)(n+m-1)\right) =$$

$$= n^2 + 2\left(n^2 + m^2 + nm - n - m - n^2 - nm + n - mn - m^2 + m\right) =$$

$$= n^2 + 2(mn) = n^2 + 2mn + m^2 = (n+m)^2$$

מכיוון ש $n \neq m$ אז הסדרה אינה סדרה חשבונית.